

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΠΟΡΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

Hazera
Seeds of Growth



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ



Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΡΔΙΑ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΣ



ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ

*Εξυπηρετούμε
τις ανάγκες σας*



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ



ΓΕΥΣΗ



ΣΠΟΡΟΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



ΠΟΙΟΤΗΤΑ



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• ΑΓΓΟΥΡΙ	5
• ΚΑΡΟΤΟ	9
• ΚΑΡΠΟΥΖΙ	10
• ΚΟΛΟΚΥΘΙ	16
• ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ	16
• ΚΡΕΜΜΥΔΙ	18
• ΛΑΧΑΝΟ	23
• ΜΑΡΟΥΛΙ	27
• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ	39
• ΜΠΡΟΚΟΛΟ	43
• ΠΑΝΤΖΑΡΙ	44
• ΠΕΠΟΝΙ	45
• ΠΙΠΕΡΙΑ	50
• ΠΡΑΣΣΟ	57
• ΡΕΠΑΝΙ	58
• ΤΟΜΑΤΑ	59
• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ	67

HAZERA - ΣΠΟΡΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Η Hazera είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα παραγωγής σπόρων. Η Hazera σας παρέχει δέσμευση, τεχνογνωσία και υποστήριξη, συνδυάζοντας την εμπειρία δεκαετιών με πρωτοποριακή τεχνολογία. Η Hazera αναπαράγει, αναπτύσσει, δημιουργεί και διακινεί ποικιλίες και σπόρους σε ευρύ φάσμα κηπευτικών σε όλο τον κόσμο.

• Παγκόσμια παρουσία

Η Hazera εδρεύει στο Ισραήλ και την Ολλανδία, με θυγατρικές εταιρείες σε δώδεκα χώρες και με εκτεταμένο δίκτυο διανομής που εξυπηρετεί πάνω από 100 επιπλέον αγορές. Αυτή η παγκόσμια παρουσία εξασφαλίζει το ότι είμαστε κοντά στους πελάτες μας και μας δίνει τη δυνατότητα να παρέχουμε τεχνική υποστήριξη και επίσης να προβλέπουμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανά τόπο ανάγκες δημιουργώντας ποικιλίες που ταιριάζουν σε συγκεκριμένα κλίματα, συνθήκες ανάπτυξης και απαιτήσεις αγοράς.

• Δέσμευση στην καινοτομία

Το ήθος μας είναι να διαπλάθουμε την πρόοδο μέσω εξειδικευμένης έρευνας. Με συνεχείς καινοτομίες, συνδυάζουμε τη σύγχρονη επιστήμη με παραδοσιακές μεθόδους αναπαραγωγής για να δημιουργήσουμε ποικιλίες ανώτερης ποιότητας και υψηλής απόδοσης. Η Hazera συνεργάζεται άμεσα με κορυφαία διεθνή ερευνητικά ιδρύματα, εφαρμόζοντας την προχωρημένη επιστήμη στη δημιουργία καλύτερων λύσεων για τους καλλιεργητές ανά την υφήλιο. Οι διαδικασίες και τα εργαστήριά μας είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας, όπως ISO και NAL.



• Ο καλλιεργητής στο επίκεντρο

Οι καλλιεργητές βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Οι επιστήμονές μας συνεργάζονται ενεργά με τους καλλιεργητές για να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους, βοηθώντας στην επιλογή ποικιλίας και παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου καλλιέργειας και συγκομιδής. Αυτή η προσέγγιση προσθέτει επιπλέον αξία στους καλλιεργητές, βοηθώντας τους να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες των καλλιεργειών τους, με ελαχιστοποίηση εξόδων οδηγώντας έτσι σε μακροπρόθεσμη ευημερία.

• Μέλος του Ομίλου Limagrain

Η Hazera είναι μέλος του Ομίλου Limagrain, μιας διεθνούς αγροτικής επιχείρησης με έδρα στη Γαλλία. Όντας γεωργικός συνεταιρισμός, ο Όμιλος Limagrain κατανοεί τις ανάγκες των πελατών της και έχει γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία σπόρων στην Ευρώπη, με ειδικότητα σε λαχανικά, αροτραίες καλλιέργειες και προϊόντα δημητριακών. Ο κλάδος σπόρων κηπευτικών της Limagrain είναι ο μεγαλύτερος παγκοσμίως.



ΑΓΓΟΥΡΙ

• ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ ΒΕΙΤ ΑΛΦΑ - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



Bereket F1

Ανοιξιότιμο - καλοκαιρινό υβρίδιο
Πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ιώσεις
Μεγάλη καλλιεργητική περίοδος

- Υβρίδιο semi - multi fruits type
- Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
- Καρπός μήκους 16-18 cm, χωρίς λαιμό
- Εύρωστο φυτό, με γρήγορη ανάπτυξη και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε εναλλαγές θερμοκρασιών
- HR*: CVYV, ZYMV
- IR*: CMV, PRSV, WMV, Px



Dennis F1

Ανοιξιότιμο - καλοκαιρινό
Μεσοπρώιμο υβρίδιο με καρπούς υψηλής ποιότητας

- Υβρίδιο multi fruits type
- Καρπός σκούρος πράσινος λαμπερός, έντονα ραβδωτός
- Καρπός μήκους 14-16 cm, χωρίς λαιμό
- Εύρωστο φυτό, με αργή ανάπτυξη και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες
- HR*: CVYN, ZYMV
- IR*: Pcu, Px



Epimon F1 **ΝΕΟ**

Ανοιξιότιμο - καλοκαιρινό υβρίδιο
Πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ιώσεις
Μεγάλη καλλιεργητική περίοδος

- Υβρίδιο semi - multi fruits type
- Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
- Καρπός μήκους 17-19 cm, χωρίς λαιμό
- Εύρωστο φυτό, με γρήγορη ανάπτυξη και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- Ιδιαίτερα καλή συμπεριφορά σε εναλλαγές θερμοκρασιών
- HR*: CVYV, ZYMV
- IR*: CMV, CYSDV, PRSV, WMV, Px



• ΑΓΓΟΥΡΙ ΚΟΝΤΟ ΒΕΙΤ ΑΛΦΑ - ΥΠΑΙΘΡΙΟ

Timor F1

Ανοιξιότιμο - καλοκαιρινό
Υπαιθριο υβρίδιο με πολλαπλή ανθεκτικότητα σε ιώσεις

- Υβρίδιο semi - multi fruits type
- Καρπός σκούρος πράσινος, χωρίς λαιμό, μήκους 7-14 cm
- Εύρωστο φυτό, με πολύ καλό φύλλωμα
- HR*: ZYMV
- IR*: CMV, CVYV, WMV2, Sf, Pc



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• ΑΓΓΟΥΡΙ ΜΑΚΡΥ DUTCH TYPE - ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ



IslaND F1 **ΝΕΟ**

Χειμωνιάτικο υβρίδιο, πρώιμη παραγωγή

- Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
- Καρπός μήκος 34-36 cm, χωρίς λαιμό και με εξαιρετική μετασυλλεκτική διάρκεια
- Καρπός μεγάλου ειδικού βάρους
- Εύρωστο φυτό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη πλαγίων βλαστών
- HR*: CVYV, Ccu
- IR*: CYSDV, Px, LCNDV



Rembrandt F1

Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο

Πρώιμο, κατάλληλο και για ημιθερμαινόμενα θερμοκήπια

- Καρπός σκούρος πράσινος και λαμπερός, ραβδωτός
- Καρπός μήκος 35-38 cm, χωρίς λαιμό και εξαιρετική μετασυλλεκτική διάρκεια
- Εύρωστο φυτό, με μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα
- Πρώιμο φυτό, με καλή συμπεριφορά σε διακυμάνσεις θερμοκρασίας
- Εύκολη και γρήγορη ανάπτυξη πλαγίων βλαστών
- HR*: CVYV, Ccu, Cca
- IR*: Px



Trimax F1

Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο

Πολλαπλές ανθεκτικότητες, κατάλληλο για βιολογική και συμβατική καλλιέργεια

- Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
- Καρπός μήκος 34-36 cm, χωρίς λαιμό και με εξαιρετική μετασυλλεκτική διάρκεια
- Εύρωστο φυτό, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- Εξαιρετικές αντοχές και υψηλή παραγωγική ικανότητα
- Ανθεκτικό στο «κάψιμο της κορυφής»
- HR*: CVYV, Ccu
- IR*: CYSDV, Px

Trinity F1 **ΝΕΟ**

Ανοιξιάτικο - καλοκαιρινό υβρίδιο

Πολλαπλές ανθεκτικότητες, κατάλληλο για βιολογική και συμβατική καλλιέργεια

- Καρπός σκούρος πράσινος, λαμπερός, έντονα ραβδωτός
- Καρπός μήκος 32-34 cm, χωρίς λαιμό και με εξαιρετική μετασυλλεκτική διάρκεια
- Εύρωστο φυτό, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα και εξαιρετικές αντοχές με υψηλή παραγωγή
- HR*: CVYV, Ccu
- IR*: CYSDV, Px



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθοτύπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

ΚΑΡΟΤΟ



Nandes - Tito

Βελτιωμένη ποικιλία τύπου Nandes 2, με πολύ εύκολη ανάπτυξη και μεσαία ωρίμανση

- Ποικιλία με υψηλές αποδόσεις, ανοχή στο «σκάσιμο», έντονο πορτοκαλί χρώμα, κυλινδρικό σχήμα κατά μήκος της ρίζας και ομοιόμορφο στογγυλεμένο τελείωμα
- Ισχυρό φύλλωμα, κατάλληλο για μηχανική συλλογή
- Ιδανική επιλογή για καλλιέργεια υπό δυσμενείς συνθήκες και βαριά εδάφη



ΚΑΡΠΟΥΖΙ

• ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΑΣΠΕΡΜΟ

Excite F1

ΝΕΟ

Το mini άσπερμο με την maximum παραγωγή

- Καρπός τύπου Crimson
- Ομοιόμορφη και μεγάλη παραγωγή
- Υψηλά σάκχαρα
- Εξωτερικός φλοιός μέσου πάχους με συνεκτική φλούδα
- Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
- Ιδανικό για εξαγωγή και εγχώρια κατανάλωση
- Σάρκα βαθυκόκκινη και τραγανή
- Καρπός μέσου βάρους 2,5-3 kg



Extazy F1

Υψηλή παραγωγή με μακρά διατηρησιμότητα

- Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
- Καρπός βάρους 2-4 kg ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 11-13%)
- Υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και ιδιαίτερα μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια
- Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη ωρίμανση
- Υψηλό δυναμικό παραγωγής
- IR*: Powdery mildew



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθοτύπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.


**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Felipe F1 **ΝΕΟ**

Υψηλή παραγωγή με μακρά διατηρησιμότητα

- Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
- Καρπός βάρους 6-8 kg ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12%)
- Υψηλή περιεκτικότητα σε λυκοπένιο και ιδιαίτερα μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια
- Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη ωρίμανση
- Υψηλό δυναμικό παραγωγής



Leopard F1 **ΝΕΟ**

Ένα άρμα στο χωράφι

- Τριπλοειδές mini καρπούζι τύπου Tiger
- Μέσο βάρος καρπών 3-4 kg
- Τραγανή σάρκα με βαθύ κόκκινο χρώμα
- Σακχαρικός τίτλος (Brix 12%)
- Συνεχόμενη παραγωγή
- Εύρωστο φυτό με πλούσιο φύλλωμα που προστατεύει την παραγωγή
- Το μεγαλύτερο παραγωγικό δυναμικό στην κατηγορία του




• ΚΑΡΠΟΥΖΙ ΕΝΣΠΕΡΜΟ

15WA-652 **ΝΕΟ**

Το νέο Crimson Type με γεύση από παλιά

- Μεγάλο παραγωγικό δυναμικό
- Τέλεια φυλλική κάλυψη των παραγόμενων καρπών
- Υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα (Brix 12-14%)
- Διάρκεια στην παραγωγή με πολύ δυνατά «δεύτερα χέρια»
- Μεγάλο παράθυρο καλλιέργειας
- Μικρή κοιλότητα σπόρων
- Ανθεκτικό στο «κούφωμα»



Miracle F1

Πρωιμότητα και υψηλή παραγωγή

- Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
- Καρπός βάρους 8-10 kg, με σχήμα ελαφρώς οβάλ
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12-13%)
- Φυτό ήπιας ανάπτυξης, υπερπρώιμης ωρίμανσης, με συγκεντρωμένη παραγωγή
- Καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Διατηρεί το σχήμα του κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες





Mirella F1

ΝΕΟ

Mini καρπούζι τύπου Crimson Sweet

- Στρογγυλό τύπου Crimson Sweet
- Βάρος: 3-5 kg, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης
- Φλοιός σκούρος ριγωτός, με σκουροπράσινες ραβδώσεις
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή, με έντονο κόκκινο χρώμα και μεγάλη μετασυλλεκτική διάρκεια
- Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Πρώιμη ωρίμανση
- Brix: 12-13%



Polimor F1

Mini και υπερπαραγωγικό

- Καρπούζι Tiger type
- Καρπός βάρους 2-4 kg ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης, με στρογγυλό σχήμα
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με πολύ λίγους σπόρους και έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12%)
- Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη ωρίμανση
- Συνεχόμενη παραγωγή



Varda F1

Το κλασικό μεγαλόκαρπο

- Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
- Καρπός βάρους 12-15 kg με σχήμα ελαφρώς οβάλ
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12-14%)
- Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και μεσοπρώιμη ωρίμανση
- Συνεχόμενη παραγωγή
- Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος και στα «δεύτερα χέρια»
- Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα
- HR*: Fon 0, 1



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Vasko F1

Πρώιμο και μεγάλοκαρπο

- Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
- Καρπός βάρους 12-15 kg, με σχήμα ελαφρώς οβάλ
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix>11%)
- Φυτό εύρωστο με πολύ καλό φύλλωμα και πρώιμη ωρίμανση
- Συνεχόμενη παραγωγή
- Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος και στα «δεύτερα χέρια»
- Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα



Zodiac F1

Η κλασική βαρέλα

- Καρπούζι τύπου Crimson Sweet
- Καρπός βάρους 12-16 kg, σε σχήμα οβάλ (Βαρέλα)
- Σάρκα γλυκιά, τραγανή με έντονο κόκκινο χρώμα (Brix 12-14%)
- Φυτό εύρωστο, με πολύ καλό φύλλωμα και κάλυψη των καρπών
- Φυτό μεσοπρώιμης ωρίμανσης, με συνεχή παραγωγή
- Πολύ παραγωγικό υβρίδιο το οποίο κρατά το μέγεθος και στα «δεύτερα χέρια»
- Ανθεκτικό στα ηλιοεγκαύματα
- HR*: Fon 0, 1



ΚΟΛΟΚΥΘΙ

Ezra F1

Πολύ πρώιμο και παραγωγικό υβρίδιο

- Καρποί με χρώμα ανοιχτό πράσινο
- Φυτό μεγάλο και ανοιχτό



ΚΟΥΝΟΥΠΙΑΙ

Cendis F1

140-160 ημερών

- Φυτό ζωηρό και ομοιογενές
- Κεφαλή συμπαγής, βαριά, ομοιόμορφου σχήματος, λευκού χρώματος και άριστης φυλλικής κάλυψης
- Περίοδος μεταφύτευσης τέλη Ιουλίου έως αρχές Σεπτεμβρίου



Ferrara F1

70-75 ημερών

- Φυτό εύρωστο με πρωιμότητα
- Κεφαλή σφαιρική, συμπαγής με ειδικό βάρος και άριστη φυλλική κάλυψη
- Καλή ανοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και στο ξεβλάστωμα
- Περίοδος φύτευσης: Άνοιξη - Καλοκαίρι



Italys F1

130-140 ημερών

- Φυτό πολύ ζωηρό
- Κεφαλή σφαιρική, λευκού χρώματος, συμπαγής, άριστης φυλλικής κάλυψης και καλή ανοχή στην υπερωρίμανση
- Υβρίδιο χειμωνιάτικο απόλυτα ταιριαστό στο μεσογειακό κλίμα
- Περίοδος μεταφύτευσης Αύγουστος - Σεπτέμβριος



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Kamis F1

95-110 ημερών

- Φυτό πολύ ζωηρό
- Κεφαλή ελκυστικού λευκού χρώματος, ομοιόμορφη, σφαιρική, συμπαγής, βαριά με άριστη φυλλική κάλυψη και προστασία
- Περίοδος μεταφύτευσης μέσα Ιουλίου - Αύγουστος
- IR*: Ring spot (Mb)



Locris F1

90-100 ημερών

- Φυτό εύρωστο
- Κεφαλή ελκυστικά λευκή, ομοιόμορφου σφαιρικού σχήματος, συμπαγής, με άριστη φυλλική κάλυψη
- Περίοδος μεταφύτευσης μέσα Ιουλίου - Αύγουστος
- HR*: Powdery mildew (Eh)
- IR*: Xanthomonas (Xcc)



Parotis F1

200-205 ημερών

- Φυτό εύρωστο και ζωηρό
- Κεφαλή λευκού χρώματος, σφαιρική, βαριά, ομοιογενής, με πολύ καλή δομή και άριστη φυλλική κάλυψη
- Περίοδος μεταφύτευσης Αύγουστος - Σεπτέμβριος



Vedis F1

210-220 ημερών

- Φυτό εύρωστο και ομοιογενές
- Κεφαλή λευκή, σφαιρική, βαριά, συμπαγής, με καλή ομοιογένεια και άριστη φυλλική κάλυψη
- Περίοδος φύτευσης Αύγουστος - Σεπτέμβριος
- IR*: Ring spot (Mb)

ΚΡΕΜΜΥΔΙ

• ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΜΙΚΡΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

Bachta F1

ΝΕΟ

Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού, με υψηλό δυναμικό παραγωγής

- Σχήμα βολβού ελαφρώς κωνικό - στρογγυλό
- Σάρκα λευκή συνεκτική
- Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Κατάλληλο για απευθείας σπορά ή μεταφύτευση και παραγωγή κοκκαριού
- Χρώμα εξωτερικού φλοιού καφέ - κόκκινο
- Πιπεράτη γεύση
- Αποθηκευτική ικανότητα 3-4 μήνες
- IR*: Pt



Canira F1

Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού, με ανθεκτικότητα στην Φαίδα καστάνωση της ρίζας (Πυρηνochaíta)

- Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους
- Σάρκα λευκή συνεκτική
- Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση και για παραγωγή κοκκαριού
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κόκκινο χρωματισμό
- Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
- Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες
- IR*: Pt



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



DMitry F1 ΝΕΟ

Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού με ανθεκτικότητα στον περονόσπορο

- Βολβός σφαιρικός, μεγάλου μεγέθους
- Σάρκα λευκή συνεκτική
- Ομοιόμορφη ωρίμανση με υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση και για παραγωγή κοκκαριού
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - βαθυκόκκινο χρωματισμό
- Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
- Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες
- IR*: Dm, Pt



Mikado F1

Πρώιμο υβρίδιο με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής

- Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους
- Σάρκα λευκή, συνεκτική
- Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Κατάλληλο για απευθείας σπορά, ή μεταφύτευση και για παραγωγή κοκκαριού
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
- Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
- Αποθηκευτική ικανότητα 5-6 μήνες



Oswald F1 ΝΕΟ

Υπερ-πρώιμο υβρίδιο με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής


- Βολβός σφαιρικού σχήματος, μεγάλου μεγέθους με λευκή συνεκτική σάρκα
- Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Κατάλληλο για απευθείας σπορά ή μεταφύτευση και για παραγωγή κοκκαριού
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
- Γεύση ελαφρώς πιπεράτη
- Αποθηκευτική ικανότητα 5-6 μήνες
- IR*: Pt



Sivan F1

Πρώιμο υβρίδιο με υψηλό δυναμικό παραγωγής

- Βολβός σφαιρικού σχήματος
- Σάρκα λευκή, συνεκτική
- Πρώιμη ωρίμανση, με ομοιόμορφους βολβούς και υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Απευθείας σπορά ή μεταφύτευση και παραγωγή κοκκαριού
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κόκκινο χρωματισμό
- Γεύση πολύ ήπια
- Αποθηκευτική ικανότητα 4-5 μήνες



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΑΣ



Orlando F1 **ΝΕΟ**

Πρώιμο υβρίδιο κρεμμυδιού ενδιάμεσης ημέρας

- Ομοιόμορφοι βολβοί σφαιρικού σχήματος
- Σάρκα λευκή συνεκτική με γεύση ελαφρώς πιπεράτη
- Απευθείας σπορά
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
- Αποθηκευτική ικανότητα 4-6 μήνες



Rhinestone F1 **ΝΕΟ**

Υβρίδιο Full Spanish type, με πολύ δυνατό ριζικό σύστημα

- Ομοιόμορφοι βολβοί σφαιρικού σχήματος
- Σάρκα λευκή συνεκτική με γεύση ελαφρώς πιπεράτη
- Απευθείας σπορά
- Εξωτερικός φλοιός με καφέ - κίτρινο χρωματισμό
- Αποθηκευτική ικανότητα 4-6 μήνες
- HR*: Pt
- IR*: Fusarium



• ΧΛΩΡΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ

Carel

Χλωρό κρεμμύδι με ιδιαίτερα εύκολη αποφλοίωση, ποιότητα και ομοιομορφία

- Χλωρό κρεμμύδι τύπου Long Tokyo
- Χρώμα φύλλων: blue green
- Ύψος φύλλων: 55 cm
- Ανθεκτικό σε ασθένειες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Εύκολο στην αποφλοίωση
- Μεγάλη διατηρησιμότητα
- Κατάλληλο για φθινοπωρινή καλλιέργεια



Savel

Χλωρό κρεμμύδι με ιδιαίτερα εύκολη αποφλοίωση, ποιότητα και ομοιομορφία

- Χλωρό κρεμμύδι τύπου Long Tokyo
- Χρώμα φύλλων: blue green
- Ύψος φύλλων: 60 cm
- Ανθεκτικό σε ασθένειες και δυσμενείς καιρικές συνθήκες
- Κατάλληλο για ανοιξιότικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια
- Πολύ καλή συμπεριφορά απέναντι στο Βοτρύτη



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.




ΛΑΧΑΝΟ

• ΛΑΧΑΝΑΚΙ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

Brilliant F1

Πρωιμότητα και απόδοση

- Κεφάλια ανοιχτοπράσινα, μεγάλα με καλή δομή και ομοιομορφία, που δεν αποκολλούνται εύκολα
- Πολύ καλό ριζικό σύστημα παρέχει προσαρμοτικότητα σε διαφορετικές συνθήκες
- Καλή ανοχή στο «σκάσιμο», το ωίδιο, και το ξεβλάστωμα




• ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ

Cali F1

ΝΕΟ

Πρώιμο υβρίδιο 80 ημερών

- Καλή διατηρησιμότητα στο χωράφι
- Κεφάλι στρογγυλό, μετρίου μεγέθους, συνεκτικό με πολύ καλή ομοιομορφία στο τελάρο
- Μέσο βάρος 1,5-2,5 kg
- Φύλλα σε βαθύ πράσινο χρώμα blue green με πικάντικη γεύση
- HR*: Foc
- IR*: Xcc



Landini F1

Υβρίδιο 85-90 ημερών

- Κεφάλι στρογγυλό με όμορφο πράσινο χρώμα, τρυφερά φύλλα και πολύ γλυκιά γεύση
- Μέσο βάρος 3-5 kg
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες και «σκάσιμο»
- HR*: Foc



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριεγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Newton F1 ΝΕΟ

95-120 ημερών

- Υβρίδιο Blue Green τύπου, 120-130 ημερών
- Μέσο βάρος 2-4 kg, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης
- Στρογγυλό κεφάλι με εξαιρετική ποιότητα και μεγάλη διατηρησιμότητα
- HR*: Foc
- IR*: Xcc



Taurus F1

95-105 ημερών

- Κεφάλι ελκυστικό, στρογγυλό, συμπαγές με υψηλό ειδικό βάρος και φύλλα έντονου blue green χρώματος, γλυκιάς και ελαφρώς πικάντικης γεύσης
- Μέσο βάρος 3-6 kg
- Ευέλικτη ποικιλία με καλή συμπεριφορά εξίσου σε ζέστη και κρύο
- HR*: Foc
- IR*: Xcc

• ΛΑΧΑΝΟ ΤΥΠΟΥ SEMI SAVOY



Tundra F1

Λάχανο 165+ ημερών

- Demi Savoy, υβρίδιο από διασταύρωση Savoy με λευκό λάχανο
- Κεφάλι στρογγυλό συνεκτικό, ελαφρώς οβάλ, μεγάλη ομοιομορφία και ελαφρώς σκούρο πράσινο χρώμα
- Βάρος 1-1,5 kg
- Μεγάλη διάρκεια παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση
- Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «σκάσιμο»



• ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Romus F1

Πολύ πρώιμο υβρίδιο 75-90 ημερών

- Κεφάλι στρογγυλό, με έντονα λαμπερό κόκκινο χρώμα
- Μεγάλη ανθεκτικότητα στη ζέστη
- Μεγάλη διάρκεια παραμονής στο χωράφι μετά την ωρίμανση
- Βάρος 1-2,5 kg
- Φύλλα τρυφερά, με γλυκιά πικάντικη γεύση
- IR*: Xcc, Yr



• ΛΑΧΑΝΟ ΤΥΠΟΥ POINTED

Regency F1

Υβρίδιο 65-85 ημερών

- Κεφάλι ελκυστικό, συνεκτικό, βάρους 1-1,5 kg με ελαφρώς γλυκιά γεύση
- Ομοιομορφία παραγωγής με ξαιρετικά χαρακτηριστικά και διατηρησιμότητα
- Καλή αντοχή στο κιτρίνισμα της βάσης



Tinty F1

Κωνικό λάχανο με έντονο κόκκινο χρώμα

- Πρώιμο υβρίδιο pointed λάχανου με ελκυστικό γυαλιστερό κόκκινο χρώμα, ομοιομορφία παραγωγής με πολύ καλές αποδόσεις και διατηρησιμότητα
- Φύλλα με γλυκιά γεύση, πολύ τρυφερά
- Μέσο βάρος 400-1200 gr, ανάλογα με την πυκνότητα φύτευσης
- Προτεινόμενη περίοδος συγκομιδής Ιούλιος - Σεπτέμβριος
- Συνιστώμενη πυκνότητα φύτευσης 5.000-7.000 φυτά/στρεμ.



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωρεογράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

ΜΑΡΟΥΛΙ

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ ΒΑΤΑΒΙΑ



Dragon Vilmorin

Η Batavia για όλες τις εποχές

- Κεφάλι μεγάλο, καλοσχηματισμένο, συμπαγές με επίπεδη βάση
- Φύλλα πράσινου φωτεινού χρώματος & έντονα κατασάρια
- Πρώιμη με καλή ανοχή στις υψηλές θερμοκρασίες
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Εξαιρετική για βιολογική καλλιέργεια
- Κατάλληλη και για μεταποίηση
- Πολύ ανθεκτική στο ξεβλάστωμα
- Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο
- HR*: BI: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0



Epsilon Vilmorin **ΝΕΟ**

Η Batavia με το ιδανικό βάρος

- Κεφάλι συμπαγές, μεγάλου ειδικού βάρους, καλοσχηματισμένο έως τη βάση
- Φύλλα με βαθύ πράσινο χρώμα, έντονα κατασάρια
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Εξαιρετική για βιολογική καλλιέργεια και για μεταποίηση
- Πολύ ανθεκτική στο ξεβλάστωμα
- Άνοιξη - Καλοκαίρι - Φθινόπωρο
- HR*: BI: 16-36 EU; Nr: 0
- IR*: LMV: 1



Minestrone Vilmorin **ΝΕΟ**

Η πρώιμη Batavia

- Κεφάλι ημικωνικό με πολύ καλή δομή και βάρος
- Φύλλα έντονα κατασάρια φωτεινού πράσινου χρώματος
- Κατάλληλη για καλλιέργεια φθινόπωρο και χειμώνα με πολύ πρώιμη ωρίμανση
- Ιδανικό για υπαίθρια & θερμοκηπιακή καλλιέργεια το χειμώνα
- Προτείνεται και για μεταποίηση
- HR*: BI: 16-32, 34, 36 EU; Nr: 0

Byzantine Vilmorin

Τρυφερή και κόκκινη

- Κεφάλι μεγάλο, κόκκινου χρώματος με πολύ καλή δομή και βάρος
- Φύλλα έντονα σγουρά με εντυπωσιακό κερασί χρώμα - double red
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο
- Προτείνεται και για μεταποίηση με καλή μετασυλλεκτική συμπεριφορά
- HR: BI: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ BUTTERHEAD



Ofelia

Η γαλλική σαλάτα για άνοιξη - φθινόπωρο

- Κεφάλι συμπαγές και μεγάλου ειδικού βάρους
- Φύλλα παχιά, γυαλιστερά, έντονου πράσινου χρώματος
- Μεσοπρώιμη σαλάτα κατάλληλη για υπαίθρια και υδροπονική καλλιέργεια
- Καλή συμπεριφορά σε θερμές συνθήκες και στο ξεβλάστωμα
- HR*: Bl: 16-30 EU



Picholine

ΝΕΟ

Η κόκκινη γαλλική σαλάτα

- Κεφάλι μεγάλο, ομοιόμορφο και καλοσχηματισμένο
- Φύλλα γυαλιστερά, έντονου βυσινί χρώματος, με καρδιά ελκυστικού πράσινου χρώματος
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
- IR*: LMV: 1



Raggioverde

Η χειμωνιάτικη γαλλική σαλάτα


- Κεφάλι πολύ ελκυστικό, μεγάλο, συμπαγές, με καλή δομή, κλειστού τύπου και επίπεδη βάση
- Φύλλα τρυφερά, γυαλιστερά, βαθύ πράσινου χρώματος και εξαιρετική ελαστικότητα στους χειρισμούς της συγκομιδής
- Μεσοπρώιμη, ιδανική για φθινοπωρινή, χειμωνιάτικη και ανοιξιότικη καλλιέργεια
- Κατάλληλη για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Bl: 16-37 EU

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ ICEBERG

Aviram

Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»

- Κεφάλι μέτριο με φύλλα ανοιχτό πράσινο χρώμα
- Μέσο βάρος 400-500 gr
- Ωρίμανση σε 35-45 ημέρες ανάλογα με την εποχή φύτευσης
- Συστήνεται κυρίως για καλοκαιρινή καλλιέργεια
- Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»




Baleron

ΝΕΟ

Το μεγάλο

- Κεφάλι μεγάλο ελαφρώς πεπλατυσμένο
- Φύλλα τρυφερά, πράσινου χρώματος
- Πρώιμη ποικιλία κατάλληλη για ανοιξιότικη και χειμωνιάτικη καλλιέργεια
- Ομοιομορφία για ευκολία στη συγκομιδή
- HR*: Bl: 16-26, 28, 31-32, 34, 36 EU; Nr: 0



Brisamar

Ποιότητα και απόδοση

- Κεφάλι μεγάλο ελαφρώς πεπλατυσμένο
- Φύλλα τρυφερά έντονου πράσινου χρώματος
- Μέσο βάρος 600-900 gr
- Ωρίμανση σε 40-55 ημέρες ανάλογα με την εποχή φύτευσης
- Συστήνεται για ανοιξιότικη, καλοκαιρινή και φθινοπωρινή καλλιέργεια
- HR*: Bl: 1-7, 10-11, 13-15, 17, Pb



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Lilach

Ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»

- Κεφάλι μέτριου μεγέθους, ελαφρώς πεπλατυσμένο, με φύλλα τρυφερά πράσινου χρώματος
- Μέσο βάρος 400-800 gr
- Ωρίμανση σε 35-45 ημέρες ανάλογα με την εποχή φύτευσης
- Συστήνεται κυρίως για καλοκαιρινή καλλιέργεια



Pursuit

ΝΕΟ

Μέγεθος και απόδοση

- Κεφάλι ομοιόμορφο, μεγάλο, συμπαγές, βαρύ, με άριστη δομή και κλείσιμο, δίνοντας πολύ καλές στρεμματικές αποδόσεις
- Φύλλα τρυφερά, γυαλιστερά, σκούρου πράσινου χρώματος
- Μέσο βάρος 700-950 gr
- Ιδανικό για καλλιέργεια άνοιξη και φθινόπωρο
- HR*: Bl: 16-37 EU; Nr: 0



Robinson

Το Iceberg παντός καιρού

- Κεφάλι μέτριο, καλοσχηματισμένο και ομοιόμορφο
- Φύλλα τρυφερά, φωτεινού πράσινου χρώματος, με εύρωστο ριζικό σύστημα που του δίνει προσαρμοστικότητα και σε δύσκολα εδάφη
- Μέσο βάρος 500-800 gr
- Ωρίμανση σε 50-65 ημέρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
- Κατάλληλο για φύτευση φθινόπωρο και χειμώνα
- HR*: Bl 1-15, 17, 19 Pb



• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ LOLLO

Bacchus

Lollo η βαθυκόκκινη - triple red

- Κεφάλι μέτριο, ελκυστικό, με φύλλα έντονα σγουρά, με βαθύ κόκκινο - βυσσινί χρώμα έως τη βάση
- Μεσοπρώιμη με καλή παραγωγή άνοιξη, φθινόπωρο, χειμώνα
- Κατάλληλη και για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Ανεκτή στο ξεβλάστωμα
- HR*: Bl: 16-26, 28, 32 EU; Nr: 0



Garone

ΝΕΟ

Η πράσινη Batavia έντονα σγουρή και σφαιρική

- Κεφάλι μεγάλο, πολύ καλά δομημένο και συνεκτικό έως τη βάση, κατάλληλο για χρήση ως Lollo
- Φύλλα έντονα κατσαρά, φωτεινού πράσινου χρώματος
- Μεσοπρώιμη, με καλή παραγωγή όλο το χρόνο
- Κατάλληλη για μεταποίηση λόγω ελαστικής υφής των φύλλων
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Ανεκτή στο ξεβλάστωμα
- HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
- IR*: LMV: 1




• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ ΟΑΚ LEAF

Amiella

Το σγουρό κόκκινο Βουργουνδίας στο καλοκαίρι

- Μέσο βάρος 500-1000 gr
- Ωρίμανση σε 35-95 ημέρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
- Κατάλληλο για αυτοματοποιημένη συλλογή
- Καλή ανοχή στο ξεβλάστωμα και το «Tip burn»
- HR*: Bl: 21, 23, LMV



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Pipeline

ΝΕΟ

To triple red Oak leaf


- Κεφάλι μεγάλο και καλοσχηματισμένο με ομοιόμορφη μεγάλη βάση
- Φύλλα μαλακά γυαλιστερά, χρώματος βαθύ κερασί μέχρι την καρδιά
- Κατάλληλο για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο
- Καλή ανταπόκριση στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
- HR*: Bl: 16-30, 32-36 EU; Nr: 0
- IR*: LMV: 1



Quelio

To υπαίθριο Oak leaf

- Κεφάλι μεγάλο, καλοσχηματισμένο και συνεκτικό
- Φύλλα σαρκώδη, ανοικτού πράσινου χρώματος
- Κατάλληλο για άνοιξη, καλοκαίρι και φθινόπωρο
- Μεσοπρώιμης ωρίμανσης, κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια και υδροπονία
- Καλή ανταπόκριση στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
- HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0
- IR*: LMV: 1



Valery

Πράσινα φύλλα βελανιδιάς

- Κατάλληλο για ανοιξιότικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια
- Μέσο βάρος 600-1200 gr
- Ανοικτού σχήματος, ελαφρώς κατσαρό
- Ωρίμανση σε 35-100 ημέρες ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες
- IR*: LMV

• ΜΑΡΟΥΛΙ ΤΥΠΟΥ ROMAINE

Conan

ΝΕΟ

Μαρούλι γίγας

- Κεφάλι πολύ μεγάλο, όρθιας ανάπτυξης ημι-ανοικτού τύπου
- Φύλλα σαρκώδη, έντονου πράσινου χρώματος
- Ιδανικό για φθινοπωρινή έως ανοιξιότικη καλλιέργεια και χειμωνιάτικη θερμοκηπιακή σε βαρύ χειμώνα
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
- HR*: Bl: 16-33 EU; Nr: 0
- IR*: LMV: 1; Fol: 1



Linoy

Μαρούλι με φύλλα σκούρου πράσινου χρώματος

- Κεφάλι μεγάλο σκούρου πράσινου χρώματος, όρθιας ανάπτυξης με καρδιά
- Ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα και στο «Tip burn»
- Βάρος 650-1000 gr
- Κατάλληλο για φύτευση άνοιξη και φθινόπωρο
- HR*: LMV, Bl 1-21



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Morales

Κατάλληλο για φθινοπωρινή καλλιέργεια

- Κεφάλι ημίκλειστου τύπου με καρδιά και φύλλα σκούρου πράσινου χρώματος
- Κατάλληλο για καλλιέργεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εκτός από τους καλοκαιρινούς μήνες
- Μέσο βάρος 650-1000 gr
- HR*: Bl: 1-21, 23, LMV



Morris

Το καλοκαιρινό

- Κεφάλι ημιόρθιας και αργής ανάπτυξης, δίνοντας μεγάλο πλεονέκτημα στους δύσκολους μήνες του καλοκαιριού
- Φύλλα έντονου πράσινου χρώματος και γευστικά
- Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα και το «Tip burn»
- HR*: LMV



Nogal

Γλυκό και καλοκαιρινό

- Κεφάλι μεγάλο ημιανοικτού τύπου, με φύλλα πολύ γευστικά και ανοικτού πράσινου χρώματος
- Μέσο βάρος 700-1200 gr
- Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα



Zephyros

Μαρούλι για άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο

- Κεφάλι μέτριο και ομοιόμορφο ανοικτού τύπου
- Φύλλα σαρκώδη έντονου πράσινου χρώματος
- Κατάλληλο και για καλλιέργεια σε θερμοκήπιο τους χειμερινούς μήνες
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στο ξεβλάστωμα και το «Tip burn»
- HR*: Bl: 16-28, 30-32 EU; Nr: 0



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ				ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ				ΜΑΡΤΙΟΣ				ΑΠΡΙΛΙΟΣ				ΜΑΪΟΣ				ΙΟΥΝΙΟΣ				ΙΟΥΛΙΟΣ				ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ				ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ				ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ				ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ				ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ							
	1η	2η	3η	4η	5η	6η	7η	8η	9η	10η	11η	12η	13η	14η	15η	16η	17η	18η	19η	20η	21η	22η	23η	24η	25η	26η	27η	28η	29η	30η	31η	32η	33η	34η	35η	36η	37η	38η	39η	40η	41η	42η	43η	44η	45η	46η	47η	48η	49η	50η	51η	52η
ROMANA																																																				
LINOY																																																				
MORALES																																																				
CONAN																																																				
ZEPHYROS																																																				
MORRIS																																																				
NOGAL																																																				
ICEBERG																																																				
BRISAMAR																																																				
ROBINSON																																																				
PURSUIT																																																				
VERNALIA																																																				
AVIRAM																																																				
SUNLINE																																																				
BATAVIA																																																				
DRAGONE																																																				
EPSILONE																																																				
BYZANTINE																																																				
LOLLO																																																				
BACCHUS																																																				
GARONE																																																				
BUTTERHEAD																																																				
OFELIA																																																				
RAGGIOVERDE																																																				
OAK LEAF																																																				
VALERY																																																				
QUELIO																																																				
AMIELLA																																																				
PIPELINE																																																				

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ

• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΦΛΑΣΚΑ

Bonica F1

Η κλασική φλάσκα

- Φυτό εύρωστο και ζωηρό
- Υβρίδιο πρώιμο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια
- Καρποί συνεκτικοί, γυαλιστεροί, σκούρου χρώματος
- Μήκος: 16-18 cm
- Βάρος: 300-350 gr



Tasca F1

Φλάσκα με μεγάλο βάρος

- Φυτό πολύ παραγωγικό, με καλή προσαρμοστικότητα και κοντά μεσογονάτια διαστήματα
- Υβρίδιο μεσοπρώιμο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια
- Καρποί μεγάλου μεγέθους
- Μήκος: 14-17 cm
- Βάρος: 400-500 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια



• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΥΠΟΥ HALF LONG

Aragon F1

Καρπός μακρύς (Δάκρυ), με σκούρο μώβ χρώμα

- Φυτό πολύ παραγωγικό, με εξαιρετική φυλλική κάλυψη
- Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια



Estelal F1

Τύπου Δάκρυ για παραγωγή και τον χειμώνα

- Φυτό καλής ζωηρότητας, ανθεκτικό στο κρύο
- Υβρίδιο πρώιμης παραγωγής, κατάλληλο για χειμερινές και ανοιξιότικες φυτεύσεις
- Καρποί άριστης ποιότητας, γυαλιστερού μαύρου χρώματος
- Μήκος: 20-22 cm
- Βάρος: 350-400 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια



Mirval F1

Τύπου Δάκρυ με πρώιμη και μεγάλη παραγωγή

- Φυτό πολύ ζωηρό με εξαιρετικές αποδόσεις, καλή φυλλική κάλυψη και κοντά μεσογονάτια διαστήματα
- Υβρίδιο υπερώριμης παραγωγής
- Καρποί ομοιόμορφοι έντονου σκούρου χρώματος με εξαιρετική διατηρησιμότητα και χωρίς αγκάθια
- Μήκος: 20-22 cm
- Βάρος: 300-350 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια



Nigral F1

ΝΕΟ

Τύπου Δάκρυ για παραγωγή και τον χειμώνα

- Φυτό ζωηρό και ανθεκτικό στο κρύο
- Υβρίδιο υψηλής παραγωγής, ιδανικό για μακράς διάρκειας καλλιέργεια
- Καρποί άριστης ποιότητας κατάλληλοι για εξαγωγή, χωρίς αγκάθια, γυαλιστερού μαύρου χρώματος που διατηρείται σε όλη τη διάρκεια της συγκομιδής
- Μήκος: 20-24 cm
- Βάρος: 350-480 gr
- Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια





Vernal F1 Vilmorin

Τύπου Δάκρυ η αποδοτική

- Φυτό με καλή προσαρμοστικότητα σε όλες τις εποχές
- Υβρίδιο μεγάλης και πρώιμης παραγωγής
- Καρποί άριστης ποιότητας με έντονο πράσινο κάλυκα
- Μήκος: 20-22 cm
- Βάρος: 300-350 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια

• ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ ΤΥΠΟΥ LONG



A117 Vilmorin

ΝΕΟ

Τύπου Λαγκαδά


- Φυτό εύρωστο
- Καλή συμπεριφορά στο κρύο
- Καρπός άριστης ποιότητας χωρίς αγκάθια με γυαλιστερό μαύρο χρώμα
- Μήκος: 27-31 cm
- Βάρος: 300-400 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια



Karatay F1 Vilmorin

Η κλασική τύπου Λαγκαδά

- Φυτό πολύ ζωνρό και παραγωγικό με άριστη φυλλική κάλυψη
- Υβρίδιο μεσοπρώιμης ωρίμανσης
- Καρπός μεγάλου μήκους
- Μήκος: 26-30 cm
- Βάρος: 250-300 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια καλλιέργεια



ΜΠΡΟΚΟΛΟ



MKS B-107

Πρώιμο υβρίδιο 70 ημερών

- Φυτό εύρωστο όρθιας ανάπτυξης
- Κεφάλι συνεκτικό, ομοιόμορφο με σκούρο πράσινο χρώμα
- Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
- Κατάλληλο για φθινόπωρο, άνοιξη



Reina F1

Υβρίδιο 95-115 ημερών

- Φυτό εύρωστο με υψηλή απόδοση
- Κεφάλι συνεκτικό, ομοιόμορφο με σκούρο πράσινο χρώμα και πολύ υψηλό ειδικό βάρος
- Άριστη μετασυλλεκτική συμπεριφορά
- Κατάλληλο για φθινόπωρο, χειμώνα



Stromboli F1

Πρώιμο υβρίδιο 60-70 ημερών

- Δυνατό φυτό, φύλλα ευθυτενή, με παραπούλια
- Ανοθοκεφαλή συνεκτική, με σκούρο πράσινο χρώμα
- Συνιστάται για όψιμες φυτεύσεις



ΠΑΝΤΖΑΡΙ


Bonel

- Μεσοπρώιμη ποικιλία με υψηλή αντοχή στο «ξεβλάστωμα»
- Βολβός στρογγυλός, μεσαίου μεγέθους, με λεπτή επιδερμίδα
- Βολβός με βαθύ σκούρο κόκκινο χρώμα, χωρίς ορατά «δακτυλίδια»
- Φύλλα μεσαίου μεγέθους, προσκολλημένα σε μικρή στεφάνη
- Εξαιρετική γεύση
- Κατάλληλο και για βιομηχανική επεξεργασία



Camaro F1

- Υβρίδιο πρώιμο κατάλληλο για ανοιξιότικες και φθινοπωρινές σπορές, με πολύ υψηλές αποδόσεις
- Βολβός λείος, ομοιόμορφος, στρογγυλός, έντονου κόκκινου χρώματος ακόμα και μετά τον βρασμό
- Φύλλωμα καλά αναπτυγμένο, με καλή συμπεριφορά στην κερκοσπορά
- Κατάλληλο για fresh market και μεταποίηση





ΠΕΠΟΝΙ

• ΠΕΠΟΝΙ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΝΑΣ



Enterprise F1

ΝΕΟ

Πορτοκαλόσαρκος ανανάς

- Καρπός με ομοιόμορφο οβάλ σχήμα και βάρος 2-3 kg
- Καρπός με πορτοκαλί επιδερμίδα και έντονο βαθύ δίκτυ
- Σάρκα με πορτοκαλί χρώμα και κρεμώδη υφή, καλή γεύση, άρωμα, (Brix 12-14%)
- Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής παραγωγής
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Fom 0, 1, 2
- IR*: Sf, Pc



Raymond F1

Πρώιμο, υψηλή παραγωγή, ιδιαίτερο άρωμα και γεύση

- Καρπός με ομοιόμορφο οβάλ σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ και βάρος 2-3 kg με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Καρπός με πορτοκαλί επιδερμίδα
- Σάρκα με κρεμώδη υφή, καλή γεύση, άρωμα, (Brix 10-13%)
- Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής παραγωγής
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Fom 0, 1, 2
- IR*: Sf, Pc



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• ΠΕΠΟΝΙ ΤΥΠΟΥ GALIA



Angel F1 (H)

Το πρώτο υβρίδιο που συνδυάζει την απόδοση και τη μετασυλλεκτικότητα του Galia με τη γεύση και το άρωμα του Ανανά

- Βάρος καρπού 1,5-2,5 kg, με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο και ανθεκτικό σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες με υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Φλοιός κίτρινος, με έντονο δίκτυ
- Σάρκα με πράσινο - κίτρινο χρωματισμό, υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα με ιδιαίτερο άρωμα & γεύση
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
- (Brix 12-14%)
- HR*: Fom 0, 1
- IR*: Pc, Sf



Garfield F1 (H)

ΝΕΟ

Πορτοκαλόσαρκο Galia

- Καρπός ομοιόμορφος και στρογγυλός βάρους 2-3 kg
- Καρπός με κίτρινο - πορτοκαλί επιδερμίδα και έντονο βαθύ δίκτυ
- Σάρκα με πορτοκαλί χρώμα, υπεροχή γεύση και άρωμα, (Brix 12-14%)
- Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και υψηλής παραγωγής
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Fom 0, 1, 2
- IR*: Sf, Pc




Honeygal F1 (H)

ΝΕΟ

Πρώιμη και υψηλή παραγωγή


- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ και βάρος 2-3 kg
- Καρπός με πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρώμα
- Εύρωστο και ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, πρώιμη ωρίμανση και υψηλή παραγωγή
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή αλλά & υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2
- IR*: Pc, Sf



Lavigal F1 (H)

Το Νο 1 σε πωλήσεις υβρίδιο πεπονιού στην Ελλάδα

- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ, βάρος 1,5-2,5 kg και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Σάρκα με πολύ καλή γεύση και άρωμα (Brix 11-13%)
- Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρώμα
- Εύρωστο, ζωηρό φυτό με πλούσιο φύλλωμα, με υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεσοπρώιμη ωρίμανση
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Fom 0, 1, 2
- IR*: Pc, Sf



Ritza F1 (H)

Πρώιμο υβρίδιο, υψηλή παραγωγή

- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, έντονο βαθύ δίκτυ, βάρος 1,5-2 kg και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Καρποί με κίτρινο - πορτοκαλί χρωματισμό
- Πολύ καλή γεύση, άρωμα και μετασυλλεκτική διάρκεια
- Σάρκα πρασινοκίτρινη με υψηλό Brix (11-13%)
- Φυτό εύρωστο γρήγορης ανάπτυξης και πρώιμης ωρίμανσης
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: MNSV, Fom 0, 1, 2
- IR*: Pc, Sf



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Sabroson F1 **ΝΕΟ**

Υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia LSL

- Στρογγυλό, με έντονο δίκτυ
- Βάρος καρπού 1-2 kg με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο
- Φλοιός με κίτρινο χρωματισμό
- Πρώιμη ωρίμανση
- Σάρκα με ανοιχτό πράσινο χρώμα, πολύ καλή γεύση και άρωμα
- Κατάλληλο και για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: MNSV, Fom 0, 1
- IR*: Pc, Sf, Fom 0, 2



Zepo F1 **ΝΕΟ**

Υβρίδιο πεπονιού τύπου Galia για πρώιμη παραγωγή
Φυτό εύρωστο, ανθεκτικό και παραγωγικό
Κατάλληλο για θερμοκήπιο

- Στρογγυλό, με έντονο δίκτυ
- Βάρος καρπού 1,5-2,5 kg με πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο, γρήγορης ανάπτυξης και πρώιμης ωρίμανσης
- Φλοιός με κίτρινο - πορτοκαλί χρωματισμό
- Πρώιμη ωρίμανση
- Σάρκα με ανοιχτό πράσινο χρώμα, πολύ καλή γεύση και άρωμα
- Κατάλληλο για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- (Brix από 14%)
- HR*: MNSV, Fom 0, 1
- IR*: Pc, Sf, Fom 0, 2



ΠΙΠΕΡΙΑ

• ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ BLOCKY

Geronimo F1

Κίτρινη και ανθεκτική στο κρύο



- Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό κίτρινο χρώμα
- Καρπός με χονδρά τοιχώματα, μέγεθος 9x9cm και βάρος 190-230 gr
- Φυτό εύρωστο με ιδιαίτερη ανθεκτικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα και μεσοπρώιμη παραγωγή
- Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: TSWV, PMMoV-P1, 2, 3



Insignia F1 **ΝΕΟ**

Το απόλυτο κίτρινο χρώμα

- Διαστάσεις: 10x10 cm
- Μέσο βάρος: 220 gr
- Λαμπερό κίτρινο χρώμα
- Χονδρά τοιχώματα
- Υψηλό ποσοστό τετράγωνων τετράλοβων καρπών
- Μεγάλη και πρώιμη παραγωγή
- Ιδανική ισορροπία καρποφορίας και φυλλικής κάλυψης
- Μπορεί να συγκομισθεί και ως πράσινη
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Ιδανική και για υδροπονικές καλλιέργειες σε οποιοδήποτε υπόστρωμα
- HR*: L4 (0, 1, 2, 3)
- IR*: TSWV (P0), Lt



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Kintal F1 Vilmorin

Φλάσκα τετράγωνη τετράλοβη

- Φυτό εύρωστο και δυνατό
- Υβρίδιο μεσοπρώιμο με πολύ καλή καρπώδεση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Καρπός τετράλοβος με παχιά τοιχώματα
- Μήκος: 10 cm
- Πλάτος: 10 cm
- Βάρος: 240-250 gr
- Κατάλληλη για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: Tm 0-3
- IR*: TSWV



Telestar F1 W

Πράσινη υπερπαραγωγή

- Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει κόκκινος, με χονδρά αλλά ιδιαιτέρως τρυφερά τοιχώματα
- Καρπός με μέγεθος 9x10 cm και βάρος 250-300 gr
- Φυτό ήπιας ανάπτυξης, με μικρά μεσογονάτια διαστήματα και πρώιμη παραγωγή
- Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: ToMV, PVY P 0, 1, Xcv (race 1, 2, 3)



Tyson F1 Vilmorin

Φλάσκα τετράγωνη τετράλοβη

- Φυτό ζωηρό
- Υβρίδιο μεσοπρώιμο καλά προσαρμοσμένο για θερμοκηπιακές συνθήκες
- Καρπός τετράγωνος τετράλοβος εξαιρετικής ποιότητας και κόκκινου χρώματος στην ωρίμανση
- Μήκος: 10 cm
- Πλάτος: 10 cm
- Βάρος: 250 gr
- Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: PMMoV: 1, 2; TMV

Valdivia F1 W

ΝΕΟ

Το τέλειο κόκκινο χρώμα

- Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό κόκκινο χρώμα
- Καρπός με χονδρά τοιχώματα, βάρος 170-230 gr και μέγεθος 9x9 cm
- Φυτό εύρωστο, ζωηρό με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα και μεσοπρώιμη παραγωγή
- Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: PMMoV-P 1, 2, 3
- IR*: TSWV



Zohar F1 W

Το τέλειο μέγεθος με το υπέροχο πορτοκαλί χρώμα

- Καλοσχηματισμένος τετράλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό πορτοκαλί χρώμα
- Καρπός με βάρος 180-210 gr και μέγεθος 9x9 cm
- Φυτό εύρωστο με πολύ καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες, μεγάλα μεσογονάτια διαστήματα και μεσοπρώιμη παραγωγή
- Προτείνεται για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: ToMV, PMMoV-P 1, 2, 3
- IR*: TSWV



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριεγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από το γραφείο μας κατόπιν αίτησης.

• ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΛΑΜΟΥΟ



Tiberio F1

Πιπεριά φλάσκα τύπου Semi - Lamuyo


- Φυτό εύρωστο και ζωηρό, μεσοπρώιμο, πολύ παραγωγικό καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγής, ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες και με αντοχή στο cracking
- Καρπός τετράλοβος ημι-επιμήκης με χοντρά τοιχώματα, σκούρου πράσινου χρώματος και κόκκινος κατά την ωρίμανση
- Πλάτος: 9 cm
- Μήκος: 14 cm
- Βάρος: 400-450 gr
- Κατάλληλη για θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: Tm: 0; PVY 0
- IR*: TSWV



Vidi F1

Πιπεριά φλάσκα τύπου Semi - Lamuyo

- Υβρίδιο μέτριας ζωηρότητας
- Καρπός τετράλοβος επιμήκης πράσινος σκούρος με κόκκινο χρωματισμό κατά την ωρίμανση
- Μήκος: 10-15 cm
- Πλάτος: 8-10 cm
- Βάρος: 350-400 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- HR*: TMV 0, PV 0.1, TEV 0



• ΠΙΠΕΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ

Fiamma F1 **ΝΕΟ**

Δυνατό φυτό με πολύ καλή φυλλική κάλυψη

- Υβρίδιο με υψηλό ποσοστό ομοιογένειας στους καρπούς
- Καρπός δύο λοβών
- Πλάτος: 5-6 cm
- Μήκος: 15-18 cm
- Βάρος: 140-180 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Κατάλληλη για εξαγωγή
- HR*: Tm 0
- IR*: TSWV, Pc



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Potomac F1

Το κλασικό υβρίδιο Φλωρίνης

- Δίλοβος πράσινος καρπός που ωριμάζει σε λαμπερό κόκκινο χρώμα
- Καρπός με χονδρά τοιχώματα, μέγεθος 5x14 cm και βάρος 120-150 gr
- Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα και πρώιμη παραγωγή
- Καλή καρπόδεση και σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Προτείνεται για υπαίθρια καλλιέργεια
- HR*: ToMV, PVY P 0, 1



Spadi F1

Πιπεριά τύπου Φλωρίνης

- Δυνατό φυτό με πολύ καλή φυλλική κάλυψη
- Υβρίδιο με υψηλό ποσοστό ομοιογένειας στους καρπούς
- Καρπός τρίλοβος πλάτους 2-5 cm
- Πλάτος: 5-6 cm
- Μήκος: 20-22 cm
- Βάρος: 220-250 gr
- Κατάλληλη για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια
- Μπορεί να συγκομισθεί και ως πράσινη
- HR*: Tm 0



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

ΠΡΑΣΣΟ



Bulgina

ΝΕΟ

Καλαμόπρασο

- Υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Φύλλα blue green, τρυφερά
- Πρώιμη ωρίμανση με ομοιόμορφα στελέχη



Pancho

Ποικιλία ανοιξιότικη - καλοκαιρινή

- Μικρή διάρκεια ωρίμανσης
- Υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Ανθεκτικότητα στο ξεβλάστωμα



Porbella

Ποικιλία φθινοπωρινή - χειμωνιάτικη

- Υψηλό δυναμικό παραγωγής
- Φύλλα blue green, τρυφερά
- Πρώιμη ωρίμανση με ομοιόμορφα στελέχη



ΡΕΠΑΝΙ

Tinto F1



- Υβρίδιο πρώιμο, καλής ζωηρότητας με ομοιομορφία συσκομιδής
- Βολβός άριστης ποιότητας, γυαλιστερού έντονου κόκκινου χρώματος, διαμέτρου 2,5-3 cm
- Κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια άνοιξη - φθινόπωρο και υπό κάλυψη νωρίς την άνοιξη



Varda

Πρώιμη ποικιλία με σφαιρικούς βολβούς

- Βολβός με λαμπερό κόκκινο φλοιό
- Σάρκα άσπρη, τραγανή, ελαφρώς πικάντικη, που δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου
- Κατάλληλο για όλες τις εποχές



TOMATA

• TOMATA ANAPPIXΩMENH



Belladona F1

Το θρυλικό υβρίδιο με την εξαιρετική ποιότητα

- Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 220-280 gr, χωρίς πράσινη ράχη
- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο με μεσοπρώιμη ωρίμανση και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)



Bellamond F1

ΝΕΟ

Εμπιστοσύνη στη γεύση

- Καρπός βαρούς 300-350 gr
- Ελαφρός πεπλατυσμένος καρπός, χωρίς πράσινη ράχη
- Ζωηρό φυτό με μικρά μεσογονάτια διαστήματα και καλή ανάπτυξη
- Μεσοπρώιμη ωρίμανση
- HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl
- IR*: Mj, Mi



Brillante F1

Το πρώτο υβρίδιο που συνδυάζει τη μεγάλη διατηρησιμότητα με τη γεύση

- Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 180-250 gr
- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με ιδιαίτερα καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο, μεσοπρώιμης ωρίμανσης και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- Πολύ καλή συμπεριφορά σε υψηλές θερμοκρασίες
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)

Iris F1

ΝΕΟ

Το νέο υβρίδιο τομάτας με μεγάλη διατηρησιμότητα

- Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 250-320 gr, χωρίς πράσινη ράχη
- Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο και με σχετικά κοντά μεσογονάτια διαστήματα
- Καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες
- Αντοχή στο «σκάσιμο»
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
- IR*: Mj, Mi, Ma



Kalloni F1

Ιδιαίτερα φιλικό προς τον καλλιεργητή

- Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 260-300 gr, χωρίς πράσινη ράχη
- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- Φυτό με υψηλό δυναμικό παραγωγής και καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
- IR*: TYLCV, Mj, Mi



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωρεγράφων την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



Nausicaa F1 **ΝΕΟ**

Παράδοση στη γεύση

- Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα και υπέροχη γεύση, βάρους 280-340 gr, χωρίς πράσινη ράχη
- Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο, με μικρά σχετικά μεσογονάτια διαστήματα και πρόωμη ωρίμανση
- HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl
- IR*: Mj, Mi

Nissos F1

Το υβρίδιο τομάτας με μεγάλη διατηρησιμότητα

- Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 250-320 gr, χωρίς πράσινη ράχη
- Καρπός με σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο και με σχετικά κοντά μεσογονάτια διαστήματα
- Καλή καρπόδεση σε υψηλές θερμοκρασίες
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, TSWV
- IR*: Mj, Mi, Ma



Primadona F1

Η εξέλιξη της Belladonna με καλύτερο ριζικό σύστημα

- Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 220-280 gr, χωρίς πράσινη ράχη
- Καρπός με στρογγυλό σχήμα, συνεκτικός με καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο με μεσοπρόωμη ωρίμανση, μικρά μεσογονάτια διαστήματα και πλούσιο ριζικό σύστημα
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)
- IR*: Mj



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωρεγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• **TOMATA ANAPPIXΩΜΕΝΗ BOUTIQUE TYPE**



Honey Dew F1

Cluster με λαμπερό πορτοκαλί χρώμα καρπού

- Υβρίδιο Cherry
- Καρπός σφαιρικού σχήματος, με λαμπερό πορτοκαλί χρώμα, βάρους 15-20 gr
- Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
- Φυτό εύρωστο, ζωηρό, μεσοπρώιμης ωρίμανσης με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Fol (race 1, 2)



Justyna F1

Cluster με ενισχυμένες ανθεκτικότητες

- Υβρίδιο Cherry - Cluster
- Καρπός σφαιρικού σχήματος με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 15-25 gr
- Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
- Φυτό εύρωστο με μικρά μεσογονάτια διαστήματα, με μεσοπρώιμη και ομοιόμορφη ωρίμανση
- HR*: ToMV, Fol (race 1, 2), For, Vd, Sl, Ff, Pst
- IR*: TYLCV, Mj



Limoncito F1

Mini Plum - Cluster με ελκυστικό κίτρινο χρώμα καρπού, ιδαιτέρως γευστικός με Brix 8-9%

- Καρπός σχήματος οβάλ, με ελκυστικό κίτρινο χρώμα, βάρους 15-25 gr
- Φυτό εύρωστο, ζωηρό, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα, μεσοπρώιμης παραγωγής και ομοιόμορφης ωρίμανσης
- HR*: ToMV, Vd, Pst

Luciplus F1

Mini Plum με υπέρροχη γεύση

- Υβρίδιο Mini Plum
- Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 15-20 gr χωρίς πράσινη ράχη
- Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό μεσοπρώιμο, εύρωστο, συμπαγές και με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Fol (race 1, 2), Vd, Sl
- IR*: Mi



Ornela F1

Το άριστο Mini plum, υπερ-παραγωγικό υβρίδιο, με ανθεκτικότητες

- Υβρίδιο Mini Plum
- Καρπός σχήματος οβάλ, με λαμπερό κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη, βάρους 15-25 gr
- Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο, ζωηρό με υψηλή παραγωγή, πρώιμη ωρίμανση και μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Fol (race 1), Pst, TSWV
- IR*: TYLCV, Mj, Mi, Sl



Shiren F1


Εύρωστο φυτό, με υψηλό δυναμικό παραγωγής

- Υβρίδιο τύπου Cherry - Cluster
- Καρπός σφαιρικού σχήματος με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 10-20 gr
- Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
- Φυτό εύρωστο, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: Fol (race 1, 2), ToMV
- IR*: Mj



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.





Summer Sun F1

Cluster με κίτρινο χρώμα καρπού

- Υβρίδιο Cherry
- Καρπός σφαιρικού σχήματος, με εντυπωσιακό κίτρινο χρώμα, βάρους 15-25 gr
- Μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα καρπού
- Φυτό εύρωστο, ζωηρό, μεσοπρώιμης ωρίμανσης με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Fol (race 1), Vd



Whitney F1

ΝΕΟ

Η γεύση στο έπακρο

- Υβρίδιο τομάτας Midi Plum με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά
- Καρπός βάρους 35-50 gr, έντονο κόκκινο χρώμα και ιδιαίτερη γεύση Brix 8-10%
- Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1)
- IR*: TYLCV

• TOMATA ANAPPIXΩΜΕΝΗ CLUSTER TYPE



Bellamia F1

Νέο υβρίδιο τσαμπί με ασυναγώνιστη ποιότητα.

- Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 140-160 gr, χωρίς πράσινη ράχη, με δυνατότητα 5-6 καρπούς ανά τσαμπί
- Καρπός με σχήμα στρογγυλό, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: Vd, Fol (race 1, 2), For, Ff, ToMV
- IR*: Mj, Mi

Ninette F1

Νέο υβρίδιο τσαμπί με ασυναγώνιστη ποιότητα

- Καρπός με έντονο λαμπερό κόκκινο χρώμα, βάρους 140-160 gr, χωρίς πράσινη ράχη, με δυνατότητα 5 έως 6 καρπούς ανά τσαμπί
- Καρπός με σχήμα στρογγυλό, συνεκτικός με μεγάλη μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο και ζωηρό, με πρώιμη ωρίμανση και μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: Vd, Fol (race 1, 2), For, Ff, ToMV
- IR*: Mj, Mi




• TOMATA ANAPPIXΩΜΕΝΗ ΡΟΖ

HTP-11 F1

Η ροζ τομάτα

- Υβρίδιο Momotaro Pink
- Καρπός στρογγυλός με ροζέ χρωματισμό, βάρους 280-350 gr
- Εξαιρετική ποιότητα καρπού με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και αρκετά καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο, πρώιμης ωρίμανσης με μικρά μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2)
- IR*: Mi



Manistella F1

ΝΕΟ

Η ροζ τομάτα για εξαγωγές

- Υβρίδιο ροζ τομάτας
- Καρπός με ελαφρώς πεπλατυσμένο σχήμα, ροζέ χρωματισμού, βάρους 250-320 gr
- Εξαιρετική ποιότητα καρπού με άριστα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά και καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Ff, Sl
- IR*: TYLCV, Mi, Mj



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που πωριγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.



• ΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΗ

Faidra F1

Μεγάλη και πρώιμη παραγωγή με μεγάλη περίοδο παραγωγής

- Καρπός με έντονο κόκκινο χρώμα, βάρους 240-320 gr., χωρίς πράσινη ράχη, ανθεκτικός στο «σκάσιμο»
- Σχήμα ελαφρώς πεπλατυσμένο με πολύ καλή διατηρησιμότητα
- Φυτό εύρωστο με πλούσιο φύλλωμα και πρώιμη συνεχή παραγωγή
- Υβρίδιο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια με υποστύλωση και σαν θάμνος
- HR*: ToMV, TSWV, ToTV, Vd, Fol (race 1,2), Sl
- IR*: TYLCV, Mj, Mi



• ΤΟΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΛΑΔΕΥΟΜΕΝΗ ROMA TYPE

Galilea F1

Roma type, εξαιρετικά παραγωγικό με μεγάλη καλλιεργητική περίοδο

- Υβρίδιο τομάτας τύπου Plum
- Καρπός με κόκκινο λαμπερό χρώμα βάρους 120-160 gr, χωρίς πράσινη ράχη σε σχήμα οβάλ
- Πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα και ανθεκτικός στο «σκάσιμο» και στο Blossom end rot
- Φυτό εύρωστο με πλούσιο φύλλωμα και πρώιμη συνεχή παραγωγή
- Υβρίδιο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια σε υποστύλωση και σαν θάμνος
- HR*: ToMV, TSWV, Vd, Fol (race 1, 2, 3), Sl, Pst
- IR*: Mj, Mi



Tyanna F1

Roma type με ανθεκτικότητα σε TYLCV

- Υβρίδιο τομάτας τύπου Plum
- Καρπός σε σχήμα οβάλ με πολύ καλή μετασυλλεκτική διατηρησιμότητα
- Καρπός με κόκκινο χρώμα βάρους 100-150 gr, χωρίς πράσινη ράχη, ανθεκτικός στο «σκάσιμο»
- Φυτό εύρωστο με πλούσιο φύλλωμα, πρώιμη και συνεχή παραγωγή
- Υβρίδιο κατάλληλο για υπαίθρια καλλιέργεια σε υποστύλωση και σαν θάμνος
- HR*: TSWV, Vd, Fol (race 1, 2), Sl, Pst
- IR*: TYLCV



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙΔΩΝ



Aurora F1

Γρήγορη βλάστηση και ομοιομορφία, καλό δέσιμο σε χαμηλές θερμοκρασίες

- Υβρίδιο Lagenaria
- Εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε χαμηλές θερμοκρασίες
- Ειδικό για πρώιμους εμβολιασμούς καρπουζιού
- Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους τύπους εδαφών
- Ανθεκτικό σε χαμηλές θερμοκρασίες
- HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2) και 1, 2, Vd
- IR*: MI



Nimbus F1

Εύκολος εμβολιασμός, άριστη συμβατότητα με εμβόλιο, παρατείνει την διάρκεια συγκομιδής

- Υβρίδιο κολοκυθίου (C. Maxima x M. Moschata)
- Ζωηρά και εύρωστα φυτά, με υψηλή ομοιομορφία και βλαστικότητα
- Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα περισσότερα υβρίδια κολοκυνθοειδών
- Λεπτός και εύκολος κατά τον εμβολιασμό βλαστός
- Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους τύπους εδαφών
- Κατάλληλο για εμβολιασμό καρπουζιού, πεπονιού και αγγουριάς
- Επιμήκυνση παραγωγής
- HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2), Vd

Shintosa F1

ΝΕΟ

Για πρώιμη παραγωγή

- Υβρίδιο κολοκυθίου (C. Maxima x M. Moschata)
- Ζωηρά και εύρωστα φυτά, με υψηλή ομοιομορφία και βλαστικότητα
- Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα περισσότερα υβρίδια κολοκυνθοειδών
- Λεπτός και εύκολος κατά τον εμβολιασμό βλαστός
- Καλή προσαρμοστικότητα στους περισσότερους τύπους εδαφών
- HR*: Fon race (1, 2), Fom race (0, 1, 2), Vd



• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ

STT3

Υποκείμενο μελιτζάνας (Solanum Torvum)

- Πολύ καλή ανθεκτικότητα στις ασθένειες του ριζικού συστήματος
- Αυξάνει την παραγωγή του φυτού φτάνοντας πολλές φορές και στον διπλασιασμό
- Συντελεί στην παραγωγή ομοιόμορφων καρπών
- Αυξάνει τη διάρκεια της συγκομιδής
- Απόλυτη συμβατότητα με πλήθος καλλιεργούμενων υβριδίων μελιτζάνας και τομάτας
- IR*: V, M, Rs, Fom, PI



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότυπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

• ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΜΑΤΑΣ

Interpro F1

Για αποτελεσματικό, πλούσιο ριζικό σύστημα

- Προάγει την πρωιμότητα σε σύγκριση με τα περισσότερα υποκείμενα
- Πολύ καλά ισορροπημένη δύναμη φυτού
- Εύκολη διαχείριση των καλλιεργειών όσο αφορά στην ισορροπία και την καρπώδεση
- Υψηλό δυναμικό απόδοσης με πολύ καλή ποιότητα καρπών
- Ευπροσάρμοστο υποκείμενο σε ποικιλία εδαφών και συνθηκών καλλιέργειας
- Για όλους του τύπους τομάτας αλλά ιδιαίτερα ιδανικό για Mini plum, Cherry και Cluster
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
- IR*: Mj, Mi, Ma

Kallipro F1

ΝΕΟ

Για σταθερότητα και πρωιμότητα

- Δημιουργεί εύρωστο φυτό, χωρίς να μεταβάλλει την ποιότητα των καρπών καθώς και την πρωιμότητα του εμβολιασμένου υβριδίου
- Κατάλληλο για όλους τους τύπους εδάφους
- Προσαρμοσμένο για μικρούς βιολογικούς κύκλους παραγωγής, άνοιξη - καλοκαίρι
- Συμβατό με όλους του τύπους υβριδίων, ειδικότερα με μεγαλόκαρπες τομάτες
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
- IR*: Mj, Mi, Ma

Rootpower F1

Η εξέλιξη του Resistar

- Φυτό εύρωστο, με μεσαία μεσογονάτια διαστήματα
- Υποκείμενο με εξαιρετική συμβατότητα για τα περισσότερα υβρίδια τομάτας
- Υψηλό ποσοστό βλαστικότητας, ομοιομορφίας και ομοιογένειας
- Γρήγορη ανάπτυξη του εμβολιασμένου φυτού και πρωίμηση της παραγωγής
- Υψηλή ομοιομορφία παραγόμενων καρπών
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
- IR*: Mj, Mi, Ma



Superpro F1

Υψηλή παραγωγικότητα και καλή ποιότητα καρπών

- Αποτελεσματικό ριζικό σύστημα με βαθιά ανάπτυξη πρωτογενών ριζών
- Υψηλά κοτυληδονόφυλλα, τα οποία κάνουν τον εμβολιασμό ευκολότερο (υψηλότερο σημείο εμβολιασμού)
- Καλή δυναμική των φυτών που επιτρέπει καλή συμπεριφορά το χειμώνα και ανάκαμψη του φυτού μετά από χαμηλές θερμοκρασίες
- Διατηρεί την καρπώδεση, το μέγεθος των καρπών και ελαχιστοποιεί «τα κουφώματα»
- Κατάλληλο για καλλιέργειες εδάφους και υδροπονία
- Καλή απόκριση του φυτού σε δύσκολες συνθήκες ανάπτυξης, όπως αλατότητα εδάφους
- Συμβατό με όλους τους τύπους τομάτας
- HR*: ToMV, Vd, Fol (race 1, 2), For, Pl
- IR*: Mj, Mi, Ma



*Οι ανθεκτικές ποικιλίες μπορεί να εμφανίσουν μερικά συμπτώματα ασθένειας ή ζημίας υπό ισχυρή πίεση παρασίτων και/ή υπό δυσμενείς περιβαλλοντολογικές συνθήκες και/ή ενώπιον νέων βιότοπων, παθότυπων, γενεών ή ειδών παρασίτου που ενδεχομένως να προκύψουν.

**Ανατρέξτε στους ορισμούς ISF στη διεύθυνση www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf. Αντίγραφο των ορισμών για τους όρους που περιγράφουν την αντίδραση φυτών σε παράσιτα για τη Βιομηχανία Φυτικών Σπόρων, μπορείτε να λάβετε από τα γραφεία μας κατόπιν αίτησης.

Crop	Scientific name	Common name English	Ελληνικά
Κρεμμύδι			
	Phytophthora nicotiane	Phytophthora neck Bulb rot	Φυτόφθορα
	Peronospora destructor	Downy mildew	Περονόσπορος
	Pyrenochaeta terrestris	Pink rot	Πυρηνοχαίτα
Πατζάρι			
	Beet necrotic yellow vein virus	Rhizomania	Ίωση κιτρινίσματος του πατζαριού
	Cercospora beticola	Leaf spot	Κερκόσπορα
	Peronospora schachtii	Downy Mildew	Περονόσπορος
Σταυρανθή	Xanthomonas campestris pv. campestris	Black rot	Βακτηριακό κάψιμο
	Albugo candida	White blister/ White rust	
	Fusarium oxysporum f.sp. conglutinans	Fusarium Yellows	Φουζάριο
	Hyaloperonospora brassicae	Downy Mildew	Περονόσπορος
	Mycosphaerella brassicicola	Ring spot	
	Plasmodiophora brassicae	Clubroot	
Πιπεριά			
	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς
	Pepper mottle virus	Pepper mottle	Ιός της ήπιας ποικιλοχρώσεως της πιπεριάς
	Potato Y virus	Potato Y	Ιός Ύψιλον της πατάτας
	Tobacco etch virus	Tobacco etch	Ιός του καπνού
	Pepper tobamovirus Group-0	"Tobacco mosaic virus Tomato mosaic virus Bell Pepper mottle virus"	Ιός της ρυτίδωσης
	Pepper tobamovirus Group-1	"Tobacco mild green mosaic virus Paprika mild mottle virus"	Ιός της ρυτίδωσης
	Pepper tobamovirus Group-2	Pepper mild mottle virus	Ιός της ρυτίδωσης
	Pepper tobamovirus Group-3	Pepper mild mottle virus	Ιός της ρυτίδωσης
	Tomato spotted wilt virus	Tomato spotted wilt	Ιός του κηλιδωτού μαρσαμού


Crop	Scientific name	Common name English	Ελληνικά
	Ralstonia solanacearum	Bacterial wilt	Βακτηρίωση της τομάτας
	Xanthomonas campestris pv. Vesicantoria	Bacterial spot	Βακτηρίωση της τομάτας
	Leveillula taurica	Powdery mildew	Ωίδιο
	Phytophthora capsici	Buckeye fruit and root rot	Φυτόφθορα
	Meloidogyne arenaria	Root-knot	Νηματώδεις
	Meloidogyne incognita	Root-knot	Νηματώδεις
	Meloidogyne javanica	Root-knot	Νηματώδεις
Υποκείμενο πιπεριάς			
	Pepper tobamovirus Group-0	"Tobacco mosaic virus Tomato mosaic virus Bell Pepper mottle virus"	Ιός της ρυτίδωσης
	Pepper tobamovirus Group-1	"Tobacco mild green mosaic virus Paprika mild mottle virus"	Ιός της ρυτίδωσης
	Pepper tobamovirus Group-2	Pepper mild mottle virus	Ιός της ρυτίδωσης
	Phytophthora capsici	Buckeye fruit and root rot	Φυτόφθορα
	Meloidogyne arenaria	Root-knot	Νηματώδεις
	Meloidogyne incognita	Root-knot	Νηματώδεις
	Meloidogyne javanica	Root-knot	Νηματώδεις
Καρπούζι			
	Colletotrichum orbiculare	Anthrachnose	Ανθράκωση
	Fusarium oxysporum f.sp. Niveum	Fusarium wilt	Φουζάριο
Πεπόνι			
	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Ιός του μωσαϊκού της αγγουριάς
	Cucurbit yellow stunting disorder virus	Cucurbit yellow stunting disorder	Ιός του κιτρινίσματος της αγγουριάς
	Melon necrotic spot virus	Melon necrotic spot	Ιός της νεκρωτικής κηλίδας
	Papaya ringspot virus	Papaya ringspot	Ιός της πανάγιας
	Tomato leaf curl New Dehli virus	Tomato leaf curl New Dehli	Ιός του Νέου Δελχί
	Watermelon mosaic virus	Watermelon mosaic	Ιός του μωσαϊκού της καρπουζιάς
	Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellow mosaic	Ιός του μωσαϊκού της κολοκυθιάς

Crop	Scientific name	Common name English	Ελληνικά
	Golovinomyces cichoracearum	Powdery mildew	
	Fusarium oxysporum f.sp. Melonis	Fusarium wilt	Φουζάριο
	Podosphaera xanthii	Powdery mildew	Ωίδιο
	Aphis gossypii	Cotton aphid	Μελίγκρα
Αγγούρι			
	Cucumber green mottle mosaic virus	Cucumber green mottle mosaic	
	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	
	Cucumber vein yellowing virus	Cucumber vein yellowing	
	Cucurbit yellow stunting disorder virus	Cucurbit yellow stunting disorder	
	Papaya ringspot virus	Papaya ringspot	
	Tomato leaf curl new Dehli virus	Tomato leaf curl new Dehli virus	Ιός του Νέου Δελχί
	Watermelon mosaic virus	Watermelon mosaic	Ιός του μωσαϊκού της καρπουζιάς
	Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellows	Ιός του μωσαϊκού του κολοκυθιού
	Pseudomonas syringae pv. Lachrymans	Angular leaf spot	Βακτήριο της αγγουριάς
	Cladosporium cucumerinum	Scab	Κλαδοσπορίωση της αγγουριάς
	Colletotrichum orbiculare	Anthrachnose	Ανθράκωση
	Corynespora cassiicola	Target spot	Κηλίδωση των φύλλων
	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-cucumerinum	Fusarium crown and root rot	Φουζάριο
	Pseudoperonospora cubensis	Downy mildew	Περονόσπορος
	Podosphaera xanthii	Powdery mildew	Ωίδιο
Υποκείμενο κολοκυνθοειδών			
	Fusarium oxysporum f.sp. Cucumerinum	Cucumber Fusarium wilt	Φουζάριο
	Fusarium oxysporum f.sp. Melonis	Melon Fusarium wilt	Φουζάριο
	Fusarium oxysporum f.sp. Niveum	Watermelon Fusarium wilt	Φουζάριο

Crop	Scientific name	Common name English	Ελληνικά
	Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum	Fusarium crown and root rot	Φουζάριο
	Phomopsis sclerotoides	Black root rot	Φόμοψη
	Rhizoctonia solani	Rhizoctonia root and crown rot	Ριζοκτόνια
	Verticillium albo-atrum	Verticillium wilt	Βερτισίλλιο
	Verticillium dahliae	Verticillium wilt	Βερτισίλλιο
	Meloidogyne incognita	Root-knot	Νηματώδεις
	Meloidogyne javanica	Root-knot	Νηματώδεις
Κολοκύθι			
	Cucumber mosaic virus	Cucumber mosaic	Μωσαϊκό της αγγουριάς
	Papaya ringspot virus	Papaya ringspot	
	Squash leaf curl virus	Squash leaf curl	Κατσάρωμα των φύλλων της κολοκυθιάς
	Tomato leaf curl New Dehli virus	Tomato leaf curl new Dehli virus	Ιός του Νέου Δελχί
	Watermelon mosaic virus	Watermelon mosaic	Μωσαϊκό της καρπουζιάς
	Zucchini yellow mosaic virus	Zucchini yellows	Μωσαϊκό της κολοκυθιάς
	Podosphaera xanthii	Powdery mildew	Ωίδιο
Καρότο			
	Xanthomonas hortorum pv. carotae	Bacterial leaf blight	
	Alternaria dauci	Alternaria leaf blight	Αλτερνάρια
	Cercospora carotae	Cercospora leaf blight	Κερκόσπορα
	Erysiphe heraclei	Powdery mildew	Ωίδιο
	Pythium sulcatum	Cavity spot	Πύθιο
	Pythium violae	Cavity spot	Πύθιο
	Psila rosae	Carrot fly	Ψύλλα
	Aster Yellows	Aster yellows	Φυτόπλασμα
Ραπανάκι			
	Albugo candida	White rust	
	Fusarium oxysporum f. sp. Raphani	Fusarium wilt	Φουζάριο
	Hyaloperonospora brassicae	Downy mildew	Περονόσπορος

Crop	Scientific name	Common name English	Ελληνικά
Φυλλώδη			
	Lettuce mosaic virus	Lettuce mosaic	Μωσαϊκό του μαρουλιού
	Tomato bushy stunt virus	Lettuce die-back	
	Maroccan pepper virus	Lettuce die-back	
	Rhizorhapis suberifaciens	Corky root	
	Bremia lactucae	Downy mildew	Περονόσπορος
	Fusarium oxysporum f.sp. Lactucae	Fusarium wilt	Φουζάριο
	Macrosiphum euphorbiae	Potato aphid	Μελίγκρα
	Nasonovia ribisnigri	Lettuce leaf aphid	Μελίγκρα
	Pemphigus bursarius	Lettuce leaf aphid	Μελίγκρα
Τομάτα			
	Tomato marchitez virus	Tomato marchitez	
	Tomato apex necrosis virus	Tomato apex necrosis	
	Tomato brown rugose fruit virus	Tomato brown rugose fruit virus	Ιός της καστανής ρυτίδωσης
	Tomato mosaic virus	Tomato mosaic	Μωσαϊκό της τομάτας
	Tomato torrado virus	Tomato torrado	
	Tomato spotted wilt virus	Tomato spotted wilt	Ιός του κηλιδωτού μαρασμού
	Tomato yellow leaf curl virus	Tomato yellow leaf curl	Ιός του κίτρινου καρουλιάσματος
	Pseudomonas syringae pv. Tomato	Bacterial speck	Βακτηριακή κηλίδωση
	Ralstonia solanacearum	Bacterial wilt	Βακτηριακός μαρασμός
	Xanthomonas campestris pv. Vesicatoria	Bacterial spot	Βακτηριακή κηλίδωση
	Alternaria alternata f. sp. Lycopersici	Alternaria stem canker	Αλτερνάρια
	Passalora fulva	Leaf mold	Κλαδοσπόριο
	Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici	Fusarium wilt	Φουζάριο
	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici	Fusarium crown and root rot	Φουζάριο ράντισις
	Leveillula taurica	Powdery mildew	Οιδιο
	Oidium neolycopersici	Powdery mildew	Οιδιο
	Phytophthora infestans	Late blight	Φυτόφθορα

Crop	Scientific name	Common name English	Ελληνικά
	Stemphyllium botryosum f. sp. Lycopersici	Gray leaf spot	Στεμφύλιο
	Stemphyllium lycopersici	Gray leaf spot	Στεμφύλιο
	Stemphyllium solani	Gray leaf spot	Στεμφύλιο
	Verticillium albo-atrum	Verticillium wilt	Βερτισίλλιο
	Verticillium dahliae	Verticillium wilt	Βερτισίλλιο
	Meloidogyne arenaria	Root-knot	Νηματοδείς
	Meloidogyne incognita	Root-knot	Νηματοδείς
	Meloidogyne javanica	Root-knot	Νηματοδείς
Υποκείμενο τομάτας			
	Tomato mosaic virus	Tomato mosaic	Ιός μωσαϊκού της τομάτας
	Ralstonia solanacearum	Bacterial wilt	Βακτηριακή κηλίδωση
	Fusarium oxysporum f. sp. Lycopersici	Fusarium wilt	Φουζάριο
	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici	Fusarium crown and root rot	Φουζάριο ράντισις
	Pyrenochaeta lycopersici	Corkie root	Πυρηνοχαίτα
	Verticillium albo-atrum	Verticillium wilt	Βερτισίλλιο
	Verticillium dahliae	Verticillium wilt	Βερτισίλλιο
	Meloidogyne arenaria	Root-knot	Νηματοδείς
	Meloidogyne incognita	Root-knot	Νηματοδείς
	Meloidogyne javanica	Root-knot	Νηματοδείς





ΧΑΖΕΡΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Λυσικράτους 64 & Κέκροπος, 17674, Καλλιθέα

www.hazera.com.gr | info@hazera.com.gr | +302109480841